

CONCURSO 2007 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA



Universidade Federal Fluminense
Centro de Ciências Médicas
Hospital Universitário Antônio Pedro

PRIMEIRA ETAPA

PROVA D3

1ª Questão: (2,0 pontos)

Menina de 6 anos apresenta-se com febre de 38,4° C, mal-estar, anorexia e cefaléia. Pelo exame físico inicial, observou-se tumefação cervical esquerda, dolorosa à palpação, não-flutuante, medindo 7 cm no seu maior diâmetro e com eritema da pele sobrejacente. Uma investigação mostrou que o domicílio da criança abriga um gatinho. Inquirida, a mãe reconheceu que a criança sofrera um arranhão extenso no antebraço esquerdo há cerca de três semanas.

Diante do exposto:

- a) indique o agente etiológico do provável diagnóstico;
- b) cite quatro possibilidades do diagnóstico diferencial;
- c) apresente três complicações;
- d) especifique o tratamento adequado.

Fonte: Nelson, 17ª edição, p. 944-945.

2ª Questão: (2,0 pontos)

Descreva a diferenciação diagnóstica entre hepatite neonatal e atresia biliar em recém-nascidos com icterícia colestática.

Fonte: Nelson, 17ª edição, p. 1317.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Lactente de seis meses apresenta-se com fontanela anterior alargada, junções costoverbrais aumentadas e alargamento das epífises dos pulsos e tornozelos.

Diante desse quadro:

- a) aponte o seu diagnóstico.
- b) cite os exames laboratoriais sanguíneos que devem ser solicitados e quais os achados típicos.
- c) relacione os achados radiológicos típicos;
- d) informe as medidas preventivas que o pediatra pode implementar.

Fonte: Nelson, 17ª edição, p. 186-188.

4ª Questão: (2,0 pontos)

Disserte sobre a diarreia crônica em lactentes e crianças, incluindo a definição, o diagnóstico diferencial e a investigação inicial.

Fonte: Nelson, 17ª edição, p. 1276-1281.

5ª Questão: (2,0 pontos)

Criança de 6 anos de idade internada na Enfermaria de Pediatria para tratamento de pneumonia bacteriana aguda apresenta no quinto dia de internação vesículas “em gota de orvalho” na face e no dorso. A mãe relatou que no dia anterior a criança apresentara máculas pruriginosas no local das vesículas. Considerando o provável diagnóstico e ainda que durante a internação várias crianças de 0,5 a 10 anos de idade tiveram contato com o caso-índice, revele qual a sua conduta em termos da prevenção de casos secundários.

Fonte: Nelson, 17ª edição, p. 1058-1062.