

CONCURSO 2016 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



1ª ETAPA - PROVA C/NN NEONATOLOGIA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 19.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.

DIGITAL		RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO											
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO											
		NOME											
		ASSINATURA: _____											

RESERVADO À BANCA AVALIADORA		
NEONATOLOGIA		rubrica:



1ª Questão: (2,0 pontos)

RN pré-termo limítrofe, sexo masculino, IG de 36 semanas, AIG, filho de mãe com Swab positivo para *Streptococcus* do grupo B; PN = 2.850g, Apgar = 9 e 9, no primeiro e quinto minutos, respectivamente; pré-natal sem intercorrências; demais exames, normais. Inicia trabalho de parto 20 horas antes do nascimento e tem as membranas ovulares rotas artificialmente uma hora após. Evolui clinicamente bem nas primeiras horas de vida. Tendo em vista o quadro:

- a) Discorra sobre a conduta inicial frente a esse RN.

Com 18 horas de vida, o RN apresenta um episódio de apneia central. Ao exame físico, 10 minutos após, apresenta-se eupneico, sem alterações. TA = 36,6°C, FC = 160, FR = 55.

- b) Conceitue apneia central
c) Caracterize esse episódio de apneia.
d) Determine a conduta indicada para o caso.

2ª Questão: (2,0 pontos)

RN de parto cesáreo, 26 semanas de IG por trabalho de parto prematuro sem causa; PN = 725 gramas. A mãe fez pré-natal adequadamente, apresentando todos os exames normais, e recebeu corticoterapia antenatal (curso completo) 24 horas antes do parto. RN nasce com Apgar = 8 e 9, no primeiro e quinto minutos, respectivamente, e é acoplado a CPAP nasal em sala de parto. Recebe uma dose de surfactante com uma hora e 30 minutos de vida e é mantido em ventilação mecânica até ser novamente acoplado, seis horas depois, à CPAP nasal. Recebe cafeína e nutrição parenteral desde o nascimento. Não necessita de antibioticoterapia. Tem sua dieta iniciada com 24 horas de vida e evolui para ar ambiente com cinco dias de vida. A dieta enteral torna-se plena com seis dias de vida, sendo suspensa a nutrição parenteral. Evolui com ganho ponderal satisfatório até que, com 20 dias de vida, necessita CPAP nasal com FiO₂ de 30% por taquipneia e quedas de saturação. Apresenta-se com ECO e gasometria normais, sem sinais de infecção. Aos 28 dias de vida, permanece em CPAP com FiO₂ de 30%. Em vista disso:

- a) Determine a patologia mais provável deste RN aos 28 dias de vida.
b) Descreva a fisiopatologia dessa doença.
c) Cite as possibilidades terapêuticas para esse RN.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Você está atendendo um RN na sala de parto em companhia de interno da pediatria. O obstetra avisa que há presença de líquido amniótico tinto de mecônio. O interno lhe entrega o aspirador de mecônio e questiona seu uso. Você explica que não necessariamente usará o dispositivo nesse caso. O interno lhe pergunta quando, obrigatoriamente, você usaria este dispositivo. Diante disso:

- a) Relacione as situações em que o procedimento é obrigatório, esclarecendo a dúvida do interno.

O mesmo RN necessita de ventilação com pressão positiva, porém, mesmo com tal procedimento, não há melhora clínica.

- b) Após reposicionar a máscara na face do RN, apresente outros cinco procedimentos cabíveis para tentar melhorar a ventilação.

O RN não apresenta boa evolução clínica e necessita de massagem cardíaca externa. Você inicia a massagem com a técnica dos polegares, momento em que o interno solicita que você mencione três vantagens dessa técnica em relação à dos dois dedos.

- c) Apresente tais vantagens, satisfazendo a curiosidade do interno.

4ª Questão: (2,0 pontos)

Você é chamado para atender bebê, sexo masculino, nascido de parto vaginal espontâneo de secundigesta de 19 anos, sem pré-natal. Ela relata ter usado cocaína no início da gravidez, antes de saber que estava grávida. O bebê não necessitou de manobras de reanimação, apesar de o líquido amniótico ser meconial. RN pesa 2320g, com 36 semanas e dois dias de IG e Apgard 7 e 9 no primeiro e quinto minutos, respectivamente. Observa-se defeito na parede abdominal com exposição das alças intestinais, aparentando leve edema. O cordão umbilical encontra-se inserido no local habitual. O defeito da parede abdominal está à direita do cordão umbilical. O RN apresenta-se levemente taquipneico, sem outros sinais de malformações aparentes. Em vista do quadro:

- a) Apresente o provável diagnóstico.
b) Determine o principal diagnóstico diferencial.
c) Cite três diferenças entre o diagnóstico provável e o principal diagnóstico diferencial.
d) Indique a conduta a ser tomada frente ao RN na sala de parto.

5ª Questão: (2,0 pontos)

Em situação de parto vaginal, você atende a RN, sexo masculino, com 4.585g (grande para a idade gestacional). Mãe diabética gestacional, clinicamente estável. Você encaminha o RN ao Alojamento Conjunto. Sendo assim:

- a) Cite os tópicos que você escolheria para a prescrição desse RN, explicando-os.

Após seis horas de vida, RN inicia quadro de tremores de extremidades.

- b) Apresente a conduta adequada para esse momento, determinando os parâmetros clínicos e laboratoriais indicados para a condução do caso.
-
-