



1ª Questão: (2,0 pontos)

A Bronquiolite Viral Aguda (BVA) é uma das infecções respiratórias mais frequentes e graves nos primeiros 24 meses de vida, especialmente nos seis primeiros. Cite as estratégias que podem ser utilizadas para evitar a infecção pelo Virus Sincicial Respiratório, principal agente etiológico da BVA.

2ª Questão: (2,0 pontos)

Lactente, onze meses, apresenta história de febre e inapetência há três dias. Mãe refere urina escura. Ao exame físico, apresenta-se ativo, reativo, hidratado e corado. Abdome flácido, sem visceromegalias, que parece doloroso à palpação de hipogástrio. Restante do exame físico normal. Exposto o quadro, determine:

- a) o diagnóstico mais provável e o principal agente etiológico envolvido;
- b) a propedêutica mais indicada para a elucidação do caso;
- c) a terapêutica indicada;
- d) a conduta mais apropriada após o tratamento dessa afecção aguda.

3ª Questão: (2,0 pontos)

Pré-escolar, dois anos, comparece à consulta de rotina com queixa de não querer comer alimentos sólidos. A mãe o mantém, quase que exclusivamente, com aleitamento materno. Ao exame físico, apresenta palidez cutâneo-mucosa moderada, hidratado, eupneico, anictérico e aci-anótico. Orofaringe e aparelho respiratório sem alterações. FR = 36 ipm, ACV com sopro sistólico 2+/6+ (escala de Levine), FC = 100bpm. Abdômen flácido, indolor, sem visceromegalias. O hemograma solicitado revela: hematócrito = 30%; Hb = 10g/Dl; VCM = 57fl; RDW = 16%, reticulócitos = 0,5%, plaquetas = 450.000, leucócitos totais = 8.000, leucometria específica = 10 eosinófilos, 30 segmentados, 55 linfócitos, 5 monócitos. Tendo em vista o quadro, apresente o diagnóstico mais provável, justificando-o.

4ª Questão: (2,0 pontos)

Em relação aos cuidados relativos a RN saudável, três dias de vida, cuja mãe recebeu o diagnóstico de tuberculose pulmonar quatro dias antes do parto e já em uso do esquema RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), apresente as orientações que devem ser fornecidas.



5ª Questão: (2,0 pontos)

Lactente, dez meses, chega à Emergência apresentando diarreia aquosa há 24 horas, dez episódios ao dia, sem sangue ou muco. Mãe refere febre baixa ($37,8^{\circ}\text{C}$), adinamia e diminuição da diurese. Ao exame, hipoativo, hipocorado, algo emagrecido, olhos encovados, mucosa oral seca, elasticidade cutânea diminuída e distensão abdominal com ruídos hidroaéreos. Isto posto, determine:

- a) o diagnóstico provável;
 - b) a conduta inicial recomendada.
-